N° I.

Sur un obsès considerable
qui occupoit toute la partie anterieure
de la poitrine
Par M. Tribalet

ouvrant multiples
pareils

Le 17. 8bre. 1746. j'ai été appellé pour voir et visitter
Le nommé Pierre bacherie tisserand demeurant aux
carrieres ditte Noire paroisse de fresne que j'ai trouvé au Lit
et qui venoit de recevoire ses derniers sacrement.
(Le 16e. jours de sa maladie) apres l'avoir examiné je lui
ait reconnue un depot considerable occupant toute
Letendue de La face anterieure, des laterales de La
poitrine, Lequel depot s'étoit formé par fluxion
(c'est adire en tres peu de tems) et avec inflammation qui s'est
annoncée par une douleur tres violente vers L'aisselle du
bras gauche, où Le malade dit avoite reconnue une
grosseur du volume d'une grosse feve.
La fievre a commencé au même moment que La douleur
a été aussi tres violente et elle a duré de même pendant
cinq a six jours, et en ce peu de tems cet engorgement
s'est étendue jusque à L'autre aisselle en couvrant
(comme je viens dedire) toute La face anterieure et
Laterale de La poitrine. ~~des~~
deux de mes confreres qui L'ont vuë peu de jours avant
moi ont dit que c'etoit un erysipele

ARC 39 n° 46

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

apres toutes Les informations et a Linspection de ce
depots, je me suis decidé à faire trois incisions de
quatre pouces chaqune, La 1e. à La partie superieure du
sternum en suivant sa direction, Les deux autres à La
partie moyenne posterieure de chaque clavicule en
dessandant sur Le muscle grand pectoral de chaque coté.
il ~~a~~ est sorti par ces ouvertures plus d'un pot de mesure
de pus assez epais, de couleur jaune, tres peu sanguinolente
mais d'une odeur tres infect, ces trois incisions ont été faite
de cette maniere afin de donner un libre cour ou issue
aux matieres qui sortoit tous les jours en quantité
considerable, et pour être à même de remedier par les
injections aux desordres qu'avoit pu produire Le sejour
du pus, ce qui m'a été confirmé à La suitte par La chute
de ~~sept eschars~~ sept escarres, ou debris ~~considerable~~ de tissue ~~cellu~~
cellulaire et aponevrotique, exquiétois d'une odeur
La plus infecte, Le sternum et Les deux grand
muscles pectoraux, ont été decouvert dans toute Leurs
etendue.
Le 19e. j'ai été obligé de faire une incision d'environ trois
pouces de Longr prenant sur La partie inferieure du
sternum en dessandant sur Le cartilage xiphoide pour
vider une poche formé entre Les deux muscle droits
qui auroit surement (parceque j'ai observé en peu de tems) été
jusque a L'ombilic à cause de La direction et de L'interval
de ces deux muscles, il est sortie par cette ouverture
beaucoup de pus de même nature que Le precedent et
à La suitte ~~un~~ une escharre ou debris de même que les
autres précédents.

Les 22 j'ai [illegible] un depot considerable situé sur La partie moyenne du grand orteil du coté gauche, il en est aussi sortie une quentite considerable depuis, et a La suitte deux eschares ou debris de même en tout que par Les autres ouvertures précédament faites.

a compter du premier pensement pandant un mois entier j'ai employer pour chaque, une demie bouteille d'une Liqueure particuliere pour faire des injections et tremper Des plumaceaux, ce qui a favorisé La chute (collyre de [illegible]) des debris, et eloigné Les suites facheuses quil y avoit a craindre.

Les quinze jours suivant de ce mois j'ai employé [illegible] a chaque pensement La mortie de La dose de La même Liqueure précédente pour tremper Les plumaceaux; —

Les onguents que j'ai employer pour chaque pensements sont encore d'une composition particuliere que j'ai —

La quentité employé a été de trois Livres (de poids) ~~pesant~~.

depuis Le 18. 8bre. 1786. que j'ai fait Le premier pensement j'ai continue regulierement tous Les jours jusque au six janvier 1787. inclusivement sans — interruption, à La même heure; sans craindre ni être arretté par La rigeure du tems, qui etois pour Lors fort triste et tres dure — — — —

j'observe encore que pandant Le premier mois, que chaque pensement duroit pres de deux heures et que peu ou point de personne pouvoit resister à L'odeure qui etois La plus infecte.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Depuis le 1er de janvier 1787. jusque et inclusivement le mois de fevrier, j'ai été pansé alternativement, et hersé de longuement pour terminer le traitement dudit pierre bochery tisserand aux carrieres dittenoire distant de plus de cinq quart de lieu de caen —

et fait le 20 juillet 1787 [illegible]

---

en 1777, étant cit. à Soissons, extirpation des amygdales à la méthode de cit. Caqué, bistouri de ligé et cuiller sur la langue; avec succès.

allonchevaux, la tête séparé du corps. Jusques ne très

Eau détersive

Pr. vitriol, bleu, romain et blanc aa ʒi
verd de gris ʒß en six livres d'eau.
ou en quatre livres pour plus d'effet.

Eau styp. Le 1r. de verd de gris.